

Alelopatski potencijal lucerne (*Medicago sativa L.*) na klijavost sjemena i rast klijanaca povrća

Ravlić, Marija; Baličević, Renata; Tucak, Marijana; Mijić, Matej; Stanić, Lucija; Stojanović, Nikolina; Skokić, Vlatka

Source / Izvornik: **Glasnik Zaštite Bilja, 2021, 44., 17 - 22**

Journal article, Published version

Rad u časopisu, Objavljena verzija rada (izdavačev PDF)

<https://doi.org/10.31727/gzb.44.5.3>

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:348552>

Rights / Prava: [In copyright / Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-07-27**



Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku

**Fakultet
agrobiotehničkih
znanosti Osijek**

Repository / Repozitorij:

[Repository of the Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek - Repository of the Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek](#)



Marija Ravlić¹, Renata Baličević¹, Marijana Tucak²,
Matej Mijić³, Lucija Stanić³, Nikolina Stojanović³, Vlatka Skokić³

Izvorni znanstveni rad

Alelopatski potencijal lucerne (*Medicago sativa L.*) na klijavost sjemena i rast kljianaca povrća

Sažetak

Cilj istraživanja bio je utvrditi alelopatski potencijal lucerne (*Medicago sativa L.*) na klijavost sjemena i rast kljianaca rotkvice (*Raphanus sativus L.*), radića (*Cichorium intybus L. var. foliosum*) i rajčice (*Lycopersicon esculentum Mill.*). Vodeni ekstrakti pripremljeni od suhe nadzemne mase lucerne u tri koncentracije (1 %, 2,5 % i 5 %) testirani su u laboratorijskim uvjetima. Alelopatski potencijal lucerne ovisio je o test vrsti, koncentraciji vodenog ekstrakta te mjerrenom parametru. Najslabije djelovanje zabilježeno je na klijavost te rast kljianaca rajčice. Povećanjem koncentracije vodenog ekstrakta povećavao se i negativni alelopatski potencijal. Najmanji utjecaj vodenih ekstrakata zabilježen je na suhu masu kljianaca test vrsta.

Ključne riječi: aleopatija, lucerna, vodeni ekstrakti, koncentracija, klijavost

Uvod

Aleopatija je definirana kao biološka pojava kojom jedan organizam (biljka, gljiva, mikroorganizam) proizvodnjom biokemijskih tvari (alelokemikalija) izravno ili neizravno, pozitivno ili negativno, utječe na rast i preživljavanje drugih organizama (Rice, 1984; Cheng i Cheng, 2015). Alelokemikalije su prisutne u svim biljnim vrstama i njihovim biljnim dijelovima, a u okoliš se oslobađaju ispiranjem, razgradnjom, isparavanjem i korijenovim izlučevinama (Rice, 1984; Zeman i sur., 2011). Alelopatske interakcije među biljnim vrstama odvijaju se u prirodnim ekosustavima te u agroekosustavima između korova i usjeva, ali i između dva usjeva i dva korova (Alam i sur., 2001).

Lucerna (*Medicago sativa L.*) je višegodišnja leguminoza i bogat izvor fitoestrogena (Tucak i sur., 2020). Lucerna djeluje supresivno kako na vlastitu vrstu (autotoksičnost), tako i na druge vrste (heterotoksičnost), dok saponini (glikozidi) iz lucerne imaju herbicidni potencijal (Wyman-Simpson i sur., 1991). Alelopatski potencijal lucerne zabilježen je na druge usjeve i korove, a ovisi o brojnim čimbenicima kao što su test vrsta, koncentracija i doza te genotip (Li i Shen, 2005; Zubair i sur., 2017; Ebrahim, 2018; Ghimire i sur., 2019; Jurić, 2020).

Aleopatija nalazi praktičnu primjenu u suzbijanju korova, posebice u onim poljoprivrednim sustavima okrenutima primjeni alternativnih mjera te ekološkim sustavima gdje primjena herbicida nije dozvoljena (Ravlić, 2015). Negativni alelopatski utjecaj pojedine biljne vrste sva-kako mora biti usmjeren na korov, no istodobno usjevi ne smiju biti pod utjecajem ili moraju biti tolerantni, a procjena alelopatskog potencijala je ključna na širokom rasponu vrsta, uklju-čujući i usjeve i korove (Baličević i sur., 2015). Stoga je cilj rada bio utvrditi alelopatski potencijal vodenih ekstrakata lucerne na klijavost sjemena i rast kljianaca povrća.

¹ doc. dr. sc. Marija Ravlić, prof. dr. sc. Renata Baličević, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, 31000 Osijek, Hrvatska

² dr. sc. Marijana Tucak, Poljoprivredni institut Osijek, 31000 Osijek, Hrvatska
Matej Mijić, mag.ing.agr., Lucija Stanić, Nikolina Stojanović, Vlatka Skokić, studenti, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, 31000 Osijek, Hrvatska
Autor za korespondenciju: mmijic@fazos.hr

Materijali i metode

Biljni materijal

Za pripremu vodenih ekstrakata korištena je biljna masa oplemenjivačke populacije lucerne (L 16/18) iz poljskog pokusa u trećoj godini uzgoja zasnovanog na seleksijskom polju Poljoprivrednog instituta Osijek, Odjela za oplemenjivanje i genetiku krmnog bilja. Nadzemna masa cijele biljke prikupljena je u fazi pupanja (vrlo rani početak cvatnje) iz prvog otkosa. Masa je sušena u sušioniku na temperaturi od 50°C, a nakon sušenja je samljevena u prah.

Priprema vodenih ekstrakata

Vodeni ekstrakti pripremljeni su prema metodi Norsworthy (2003) miješanjem 5 grama suhe biljne mase lucerne s 100 ml destilirane vode. Pripremljena mješavina stajala je 24 sata na temperaturi 22 (± 2) °C, nakon čega je procijeđena kroz muslimsko platno, te filtrirana kroz filter papir. Dobiveni vodeni ekstrakt koncentracije 5 % razrijeđen je destiliranom vodom kako bi se dobili vodeni ekstrakti koncentracije 1 % i 2,5 %.

Test vrste

Kao test vrste u pokusu su istraženi rotkvica (*Raphanus sativus L.*) (cv. Saxa), radič (*Cichorium intybus L. var. foliosum*) (cv. Pan di Zuccheri) i rajčica (*Lycopersicon esculentum Mill.*) (cv. Volovsko srce). Sjeme sve tri test vrste prije pokusa je površinski dezinficirano s 1 % NaOCl tijekom 20 minuta, nakon čega je isprano destiliranom vodom (Siddiqui i sur., 2009).

Postavljanje i provedba pokusa

Pokusi su provedeni u kontroliranim laboratorijskim uvjetima, a shema pokusa izvedena je prema potpuno slučajnom planu s tretmanima u šest ponavljanja. Tretmani u pokusu su se sastojali od naklijavanja 30 sjemenki test vrsta u Petrijevim zdjelicama na filter papiru navlaženom s 3 ml vodenog ekstrakta određene koncentracije. U kontrolnom tretmanu sjeme sve tri test vrste naklijavano je na filter papiru navlaženom destiliranom vodom. Sjeme rotkvice i radiča ostavljeno je da klija 5 dana pri temperaturi od 22 (± 2) °C, na laboratorijskim klupama, dok je sjeme rajčice ostavljeno da klija 10 dana pri istim uvjetima.

Prikupljanje i statistička obrada podataka

Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata lucerne procijenjen je na kraju pokusa mjerjem sljedećih parametara: ukupna klijavost sjemena (%), duljina korijena klijanaca (cm), duljina izdanka klijanaca (cm), ukupna svježa masa klijanaca (mg) i ukupna suha masa klijanaca (mg). Prikupljeni podatci obrađeni su koristeći Microsoft program Excel (izračun srednjih vrijednosti mjerjenih parametara), te statistički analizom varijance (ANOVA), a razlike između srednjih vrijednosti tretmana testirane su LSD testom na razini 0,05.

Rezultati i rasprava

Vodeni ekstrakti lucerne pokazali su statistički značajan alelopatski utjecaj na klijavost i rast rotkvice, a negativni učinak povećavao se s povećanjem koncentracije vodenog ekstrakta. Klijavost sjemena rotkvice snižena je pri dvije više koncentracije vodenog ekstrakta i do 66,1 % u odnosu na kontrolni tretman. Najveće smanjenje duljine korijena klijanaca rotkvice zabilježeno je pri najvišoj koncentraciji vodenog ekstrakta i iznosilo je 90,9 % u odnosu na kontrolu. Vodeni ekstrakti lucerne statistički su značajno smanjili duljinu izdanka i svježu masu klijanaca rotkvice u svim tretmanima. S druge strane, nije zabilježeno statistički značajno smanjenje suhe mase klijanaca rotkvice (Tablica 1).

Tablica 1. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata lucerne na klijavost i rast kljianaca rotkvice/
Table 1. Allelopathic effect of alfalfa water extracts on germination and growth of radish seedlings

Koncentracija (%) vodenog ekstrakta lucerne/ Alfalfa water extract concentration (%)	Klijavost (%)/ Germination (%)	Duljina korijena (cm)/ Root length (cm)	Duljina izdanka (cm)/ Shoot length (cm)	Svježa masa (mg)/ Fresh weight (mg)	Suha masa (mg)/ Dry weight (mg)
Kontrola / Control	98,3 a	3,40 a	1,81 a	67,00 a	8,95 a
1 %	96,2 a	3,08 a	1,47 b	53,33 b	9,05 a
2,5 %	83,3 b	1,45 b	1,08 c	47,00 c	9,38 a
5 %	33,3 c	0,31 c	0,64 d	30,33 d	9,13 a

a, b, c, d – vrijednosti označene istim slovom za svaki parametar nisu statistički značajno različite ($P < 0,05$)/
a, b, c, d, - means followed by the same letter for each parameter are not significantly different at $P < 0,05$.


Vodeni ekstrakti lucerne statistički su značajno utjecali na klijavost sjemena i rast kljianaca radiča (Tablica 2). Klijavost sjemena snižena je značajno pri najvišoj koncentraciji vodenog ekstrakta za 54,5 % u odnosu na kontrolu. Duljina korijena kljianaca snižena je u svim tretmanima, i do 95,4 % u odnosu na kontrolu. Povećanjem koncentracije vodenih ekstrakata povećavao se i negativni utjecaj na duljinu izdanka te svježu masu kljianaca. Suha masa kljianaca snižena je samo u tretmanu s najvišom koncentracijom ekstrakta i to za 22,3 % (Tablica 2).

Tablica 2. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata lucerne na klijavost i rast kljianaca radiča/
Table 2. Allelopathic effect of alfalfa water extracts on germination and growth of radicchio seedlings

Koncentracija (%) vodenog ekstrakta lucerne/ Alfalfa water extract concentration (%)	Klijavost (%)/ Germination (%)	Duljina korijena (cm)/ Root length (cm)	Duljina izdanka (cm)/ Shoot length (cm)	Svježa masa (mg)/ Fresh weight (mg)	Suha masa (mg)/ Dry weight (mg)
Kontrola / Control	79,4 a	2,18 a	1,18 a	18,28 a	0,94 a
1 %	82,8 a	0,44 b	0,49 b	7,56 b	0,81 ab
2,5 %	78,9 a	0,32 c	0,41 b	6,10 c	0,79 ab
5 %	36,1 b	0,10 d	0,15 c	4,63 d	0,73 b

a, b, c, d – vrijednosti označene istim slovom za svaki parametar nisu statistički značajno različite ($P < 0,05$)/
a, b, c, d, - means followed by the same letter for each parameter are not significantly different at $P < 0,05$.

Vodeni ekstrakti lucerne pokazali su alelopatski utjecaj na klijavost sjemena rajčice (Tablica 3). Statistički značajno smanjenje klijavosti zabilježeno je samo u tretmanu s najvišom koncentracijom vodenog ekstrakta gdje je klijavost smanjena za 29,9 % u donosu na kontrolu. Suprotno tome, sve koncentracije vodenog ekstrakta negativno su djelovale na duljinu korijena klijanaca koji je smanjen i do 88,5 %. Najviša koncentracija vodenog ekstrakta statistički je značajno smanjila duljinu izdanka, te svježu i suhu masu klijanaca rajčice, dok niže koncentracije nisu imale utjecaja (Tablica 3).



c) ekstrakt koncentracije 2,5 %

d) ekstrakt koncentracije 5 %

Slika 1. Utjecaj vodenih ekstrakata lucerne na duljinu izdanka klijanaca rotkvice

Figure 1. Influence of alfalfa water extracts on shoot length of radish seedlings

Tablica 3. Alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata lucerne na klijavost i rast klijanaca rajčice/
Table 3. Allelopathic effect of alfalfa water extracts on germination and growth of tomato seedlings

Koncentracija (%) vodenog ekstrakta lucerne/ Alfalfa water extract concentration (%)	Klijavost (%)/ Germination (%)	Duljina korijena (cm)/ Root length (cm)	Duljina izdanka (cm)/ Shoot length (cm)	Svježa masa (mg)/ Fresh weight (mg)	Suha masa (mg)/ Dry weight (mg)
Kontrola / Control	85,6 a	7,29 a	3,14 a	28,62 a	1,61 a
1 %	88,9 a	5,81 b	3,36 a	27,80 a	1,67 a
2,5 %	85,6 a	4,68 c	3,28 a	27,64 a	1,69 a
5 %	60,0 b	0,84 d	0,83 b	9,99 b	1,21 b

a, b, c, d – vrijednosti označene istim slovom za svaki parametar nisu statistički značajno različite ($P < 0,05$);
a, b, c, d, - means followed by the same letter for each parameter are not significantly different at $P < 0,05$.

Alelopatski potencijal lucerne ovisio je o test vrsti, koncentraciji vodenog ekstrakta te mjenom parametru. Klijavost, duljina izdanka klijanaca te svježa i suha masa rajčice bile su pod najmanjim utjecajem vodenih ekstrakata lucerne. Prema Ebrahim (2018) vodeni ekstrakti i biljni ostaci lucerne negativno djeluju na klijavost i rast dviju vrsta mahunarki, duge vigne (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) i slanutka (*Cicer arietinum* L.) sa značajnim razlikama u osjetljivosti među testiranim vrstama. Test vrste, a i genotipovi unutar vrsta uvelike se mogu razlikovati u svojoj osjetljivosti na alelopatsko djelovanje (Aleksieva i Marinov-Serafimov, 2008; Ravlić, 2015).

Povećanjem koncentracije vodenog ekstrakta povećavao se i negativni alelopatski utjecaj vodenih ekstrakata lucerne. Slično navodi Jurić (2020) prema kojem su vodeni ekstrakti lucerne više koncentracije (2,5 %) imali statistički značajno veći negativni učinak na klijavost sjemena i rast klijanaca salate od vodenih ekstrakata niže koncentracije (1 %). Niže koncentracije vodenih ekstrakata nisu djelovale negativno na klijavost i rast klijanaca rajčice te klijavost i suhu masu klijanaca radiča. Pozitivno djelovanje niskih koncentracija vodenih ekstrakata moguće je primjeniti u cilju stimulativnog djelovanja na klijanje i početni razvoj klijanaca (Baličević i sur., 2018).

Alelopatski potencijal biljne vrste ovisi i o drugim čimbenicima. Xuan i Tsuzuki (2002) navode da intenzitet alelopatskog potencijala na salatu uvelike ovisi o sorti lucerne. Vrijeme otkosa nadzemne mase lucerne prema Jurić (2020) statistički je značajno utjecalo na alelopatski potencijal vodenih ekstrakata, pri čemu su u prosjeku vodeni ekstrakti lucerne iz trećeg otkosa imali najveće inhibitorno djelovanje na mjerene parametre. Vodeni ekstrakti od suhe nadzemne mase najčešće imaju jači inhibitorni potencijal (Marinov-Serafimov, 2010; Muhammad i Majeed, 2014).

Zaključak

Rezultati istraživanja pokazali su da lucerna posjeduje značajan alelopatski potencijal te izraziti inhibitorni učinak viših koncentracija na gotovo sve mjerene parametre test vrsta. Niže koncentracije vodenih ekstrakata nisu značajno utjecale na klijavost te rast klijanaca rajčice koja se pokazala najmanje osjetljivom među istraženim test vrstama.

Literatura

- Alam, S.M., Ala, S.A., Azmi, A.R., Khan, M.A., Ansari, R. (2001) Allelopathy and its Role in Agriculture. *Journal of Biological Sciences*, 1(5), 308-315.
- Aleksieva, A., Marinov-Serafimov, P. (2008) A study of allelopathic effect of *Amaranthus retroflexus* (L.) and *Solanum nigrum* (L.) in different soybean genotypes. *Herbologia*, 9(2), 47-58.
- Balićević, R., Ravlić, M., Lucić, K., Tatarević, M., Lucić, P., Marković, M. (2018) Allelopathic effect of *Aloe vera* (L.) Burm. F. on seed germination and seedlings growth of cereals, industrial crops and vegetables. *Poljoprivreda*, 24(2), 13-19.
- Balićević, R., Ravlić, M., Živković, T. (2015) Allelopathic effect of invasive species giant goldenrod (*Solidago gigantea* Ait.) on crops and weeds. *Herbologia*, 15(1), 19-29.
- Cheng, F., Cheng, Z. (2015) Research Progress on the use of Plant Allelopathy in Agriculture and the Physiological and Ecological Mechanisms of Allelopathy. *Frontiers in Plant Science*, 6, 1-16.
- Ebrahim, F.K. (2018) Allelopathic effect of alfalfa *Medicago sativa* on germination and growth of two legumes species *Cicer arietinum* and *Vigna unguiculata*. *College Of Basic Education Researches Journal*, 14(1), 445-456.
- Ghimire, B.K., Ghimire, B., Yu, C.Y., Chung, I.M. (2019) Allelopathic and Autotoxic Effects of *Medicago sativa* – Derived Allelochemicals. *Plants*, 8(7), 233.
- Jurić, B. (2020) Alelopatski potencijal lucerne (*Medicago sativa* L.) na klijavost i rast salate (*Lactuca sativa* L.). Diplomski rad. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek.
- Li, Z., Shen, Y. (2005) Study on the allelopathy of alfalfa. *Pratacultural Science*, 22(12), 33-36.
- Marinov-Serafimov, P. (2010) Determination of allelopathic effect of some invasive weed species on germination and initial development of grain legume crops. *Pesticides and Phytomedicine*, 25(3), 251-259.
- Muhammad, Z., Majeed, A. (2014) Allelopathic effects of aqueous extracts of sunflower on wheat (*Triticum aestivum* L.) and maize (*Zea mays* L.). *Pakistan Journal of Botany*, 46, 1715-1718.
- Norsworthy, J.K. (2003) Allelopathic potential of wild radish (*Raphanus raphanistrum*). *Weed Technology*, 17, 307-313.
- Ravlić, M. (2015) Alelopatsko djelovanje nekih biljnih vrsta na rast i razvoj usjeva i korova. Doktorska disertacija. Poljoprivredni fakultet Osijek.
- Rice, E.L. (1984) Allelopathy. Academic Press, London.
- Siddiqui, S., Bhardwaj, S., Khan, S.S., Meghvanshi, M.K. (2009) Allelopathic effect of different concentration of water extract of *Prosopis juliflora* leaf on seed germination and radicle length of wheat (*Triticum aestivum* Var-Lok-1). *American – Eurasian Journal of Scientific Research*, 4(2), 81-84.
- Tucak, M., Čupić, T., Horvat, D., Popović, S., Krizmanić, G., Ravlić, M. (2020) Variation of Phytoestrogen Content and Major Agronomic Traits in Alfalfa (*Medicago sativa* L.) Populations. *Agronomy*, 10(1), 87.
- Wyman-Simpson, C.L., Waller, G.R., Jurzysta, M., McPherson, J.K., Young, C.C. (1991) Biological activity and chemical isolation of root saponins of six cultivars of alfalfa (*Medicago sativa* L.). *Plant and Soil*, 135(1), 83-94.
- Xuan, T.D., Tsuzuki, E. (2002) Varietal differences in allelopathic potential of alfalfa. *Journal of Agronomy and Crop Science*, 188(1), 2-7.
- Zeman, S., Fruk, G., Jemrić, T. (2011) Alelopatski odnosi biljka: pregled djelujućih čimbenika i mogućnost primjene. *Glasnik zaštite bilja*, 34(4), 52-59.
- Zubair, H.M., Pratley, J.E., Sandral, G.A., Humphries, A. (2017) Allelopathic interference of alfalfa (*Medicago sativa* L.) genotypes to annual ryegrass (*Lolium rigidum*). *Journal of Plant Research*, 130, 647-658.

Prispjelo/Received: 15.9.2021.

Prihvaćeno/Accepted: 1.10.2021.

Original scientific paper

Allelopathic potential of alfalfa (*Medicago sativa* L.) on seed germination and seedling growth of vegetables

Abstract

The aim of the study was to determine the allelopathic potential of alfalfa (*Medicago sativa* L.) on seed germination and seedling growth of radish (*Raphanus sativus* L.), radicchio (*Cichorium intybus* L. var. *foliosum*) and tomato (*Lycopersicon esculentum* Mill.). Water extracts prepared from dry alfalfa biomass in three concentrations (1%, 2.5% and 5%) were tested under laboratory conditions. The allelopathic potential of alfalfa depended on the test species, the water extract concentration, and the measured parameter. The weakest effect was recorded on germination and growth of tomato seedlings. As the concentration of the water extract increased, the negative allelopathic potential also increased. Dry weight of seedlings of test species was the least affected.

Keywords: allelopathy, alfalfa, water extracts, concentration, germination