

Benefitni mikroorganizmi kao alternativa kemijskim fungicidima

Cvjetković, Milan

Master's thesis / Diplomski rad

2016

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of agriculture / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:151:101257>

Rights / Prava: [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-07-08**



Sveučilište Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku

**Fakultet
agrobiotehničkih
znanosti Osijek**

Repository / Repozitorij:

[Repository of the Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek - Repository of the Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek](#)



Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Milan Cvjetkovi

Diplomski studij: Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Smjer: Vinogradarstvo i vinarstvo

**BENEFITNI MIKROORGANIZMI KAO ALTERNATIVA
KEMIJSKIM FUNGICIDIMA**

Diplomski rad

Osijek, 2016.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Milan Cvjetkovi

Diplomski studij: Voštinarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Smjer: Vinogradarstvo i vinarstvo

BENEFITNI MIKROORGANIZMI KAO ALTERNATIVA KEMIJKIM FUNGICIDIMA

Diplomski rad

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada:

1. Izv.prof.dr.sc. Karolina Vrandečić, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Suzana Kristek, mentor
3. Izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo, član

Osijek, 2016.

SADRŽAJ

1. Uvod	1
2. Mogu nosti primjene biofungicida.....	3
3. Mehanizmi djelovanja biofungicida	5
4. Podjela biofungicida i njihova uporaba	8
5. Problemi u proizvodnji i primjeni biofungicida	20
6. Prednosti i nedostaci biofungicida.....	21
7. Zaključak	22
8. Popis literature:.....	23
9. Sažetak.....	26
10. Summary.....	27
11. Popis slika.....	28

TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

BASIC DOCUMENTATION CARD

1. Uvod

U cilju zaštite bilja, te u konačnici zbog unaprijeđena proizvodnje uvijek danas upotrebljava širok spektar različitih pesticida. Primjena mnogih od njih je diskutabilna sa toksikološkog gledišta.

Posljednjih desetljeća, u javnosti, pa i u stručnim krugovima, raste zabrinutost, kako zbog smanjenja efikasnosti pesticida uslijed razvoja rezistentnosti štetnih organizama, tako i zbog novih saznanja o riziku njihove primjene po zdravlje ljudi, zagađivanje proizvoda i nepovoljnim efektima na životnu sredinu u cjelini (Warrior, 2000.).

Me uprodukti degradacije često su perzistentniji od polaznog spoja, ostaju duže vrijeme u tlu ili vodi (podzemne vode), što može ostaviti posljedice i za naredne biljke u plodoredu (Čorović, 2008.).

Današnji trendovi u fitomedicini nalažu upotrebu ekološki prihvatljivih metoda zaštite bilja koje se postižu smanjenjem upotrebe standardnih kemijskih sredstava u zaštiti bilja, te primjenom preventivnih mjera zaštite i najnovijih metoda bioloških mjera (Balić i sur., 2007.).

Stvaranje nepovoljnih uvjeta za razvoj bolesti primjenom agrotehničkih mjera, primjena bioloških produkata i antagonističkih organizama, superparazita, ili predatora, uvođenje kompetitorskih vrsta pojedinačno, ili integrirano sa manje rizičnim pesticidima, su tehnologije zaštite kojima se danas teži (Klokoćar-Šmit i sur., 2006; Grgić, 2009.).

Upotrebom korisnih mikroorganizama oslanja se na njihove produkte metabolizma u što se ubrajaju spore, kristali, toksini i antibiotici. Spomenuti posjeduju antagonističko djelovanje na pojedine uzročnike bolesti poput korova, štetnih nematoda i kukaca. Produkti korisnih mikroorganizama poput npr. enzima i vitamina mogu imati pozitivan utjecaj na povećanje otpornosti tretiranih biljaka. Valja napomenuti da su bezopasni za ljude i korisne mikroorganizme te da su ekološki prihvatljivi.

Podjela biopesticida izvršena je prema vrsti organizama koje suzbijaju, i to na: bioinsekticide, biofungicide, bioherbicide i druge. Svjetski priručnici o biopesticidima u njihovoj većini uključuju makrobiološke agense i mikrobiološke agense, zatim prirodne pesticide i derivate nekih organizama. U Hrvatskoj je ta podjela također prihvaćena (Igrc-Bar i i Maceljki, 2001.).

2. Mogu nosti primjene biofungicida

Da bi se proizveo u inkovit biološki preparat potrebno je dobro poznavanje me usobnog odnosa između mikroorganizma i objekta suzbijanja. Prema Kloko ar-Šmit i sur. (2006.), da bi se dobio u inkovit preparat potrebna je:

-) mogućnost proizvodnje na tekućem ili polu-vrhom supstratu u dovoljnim količinama
-) vitalnost tijekom čuvanja i nakon primjene preparata
-) da pod selekcijskim tlakom u laboratorijskim uvjetima ne izgube vitalnost, varijabilnost i selektivnost.

Veći dio formulacije biopreparata čine hranjive i vezivne tvari, nosači ili štikeri koje se nalaze u obliku prašina, vodotopivih granula, mikrokapsula, gela, itd.

Biofungicidi su pripravci na osnovi mikro-gljivica, bakterija i *Actinomyceta* koje su antagonist fitopatogenih gljivica. Ti antagonisti su organizmi nisu genetički modificirani od strane čovjeka. Radi se o korisnim organizmima koji su u prirodi sastavni dio mikrosvijeta (microbiota), rizosfere i filozfere gdje se za stanište i hranjive tvari nadmeću s mikroorganizmima štetnim za biljke (Topolovec-Pintari i Cvjetkovi, 2003.).

Prema Maceljskom sur. (2004.), u Hrvatskoj i svijetu se najviše koriste biopesticidni pripravci na bazi bakterije *Bacillus thuringiensis*. Navedena bakterija proizvodi kristale koji sadrže proteine koji su toksični za kukce.

B. thuringiensis producira toksin delta-endotoksin koji kada dođe u probavne organe kukca prije i njegovu ishranu. Ima sporo djelovanje, dan dva nakon primjene prestaju ishrana i štete, a smrt nastupa nakon 3-5 dana (Igrc-Bar i i Maceljski, 2001.).

Pripravci koji sadrže gljivicu *Verticillium lecanii* koriste se za suzbijanje lisnih i štitaštih uši te štitaštog moljca u zaštiti otvorenog prostora, dok se pripravci na osnovi gljivice *Beauveria*

bassiana koriste u suzbijanju krumpirove zlatice, kukuruznog moljca, cvjetnog štitastog moljca (Igrc-Bar i i Maceljki, 2001.).

Pripravci na osnovi bakterije *Bacillus thuringiensis kurstaki* koriste se za suzbijanje gusjenica leptira, a podvrsta *Bacillus thuringiensis tenebrionis* za suzbijanje li inki kornjaša (Maceljki i sur., 2004.).

U Hrvatskoj je registriran samo jedan biofungicid i to na bazi *Trichoderma harzianum* koji je sadržan u pripravku Trichodex WP. On djeluje preventivno na gljivicu *Botrytis cinerea* na raznim kulturama. Registriran je za suzbijanje *Botrytis cinerea* na vinovoj lozi i jagodama. Karenca je 14 dana na vinovoj lozi, 4 dana na jagodama. Ne ubraja se u otrove. (Maceljki, 2005., Lu i , 2009) .


3. Mehanizmi djelovanja biofungicida

Po navodima Topolovec-Pintari i Cvjetkovi (2003.), razlikuje se nekoliko mehanizama djelovanja biofungicida:

-) Inducirana otpornost biljke doma ina;
-) antibioza;
-) direktna kompeticija;
-) parazitizam.

Inducirana otpornost se javlja kada se u napadnutoj biljci aktivira obrambeni mehanizam pa se ona sama brani od napada uzročnika bolesti (Grahovac i sur., 2009.). Ona npr. štiti biljku od svih sojeva ali istog virusa, ali ne i od drugih virusa.


Kod biljaka doma ina se namjerno upotrebljava inokulacija upravo zbog izazivanja inducirane otpornosti. Kao primjer mogu se uzeti dvije zaražene stabljike različitih kultivara rajice sa *Botrytis cinerea*. Dok je desni kultivar inokuliran sa *Trichoderma harzianum*, lijevi nije te su uočljivi simptomi (slika 1.).



Slika 1. Zaraženi i inokulirani kultivar rajice

Izvor: http://www.frontiersin.org/files/Articles/50111/fpls-04-00206-HTML/image_m/fpls-04-00206-g001.jpg

Antibioza je sposobnost inhibicije ili “uništavanja” biljnih parazita toksičnim produktima metabolizma antagonističkih organizama (biološki agensi - BA). Toksični produkti BA su najčešće antibiotici (Grahovac i sur., 2009.). *Agrobacterium radiobacter* – izolat K 84 zaustavlja rast tumora kojim je uzročnik *Agrobacterium tumefaciens*.



Slika 2. Zaraženi i inokulirani korijen šljive

Izvor: <http://www.accessscience.com/loadBinary.aspx?filename=529200FG0030.gif>

Direktna kompeticija podrazumijeva da se korijen biljke domaćina (rizosfera) mora naseliti organizmom koji se primjenjuje za biološko suzbijanje uzročnika bolesti prije nego što dođe do infekcije patogenom (Grahovac i sur., 2009.).



Slika 3. *Gaeumannomyces graminis tritici*

Izvor: <http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/pub811/14cereal.htm>

Kompeticija je natjecanje antagonističkih organizama sa biljnim parazitima oko izvora hraniva, kisika te samog prostora. *Gaeumannomyces graminis* ovisi o žetvenim ostacima ijom razgradnjom propada i sam fakultativni parazit.

Parazitizam je sposobnost organizma koji se primjenjuje za biološku kontrolu da napada patogeni organizam i njime se hrani, pri čemu biološki agens mora biti prisutan prije napada patogena (Grahovac i sur., 2009.). Primjerice, izolat *Trichoderma harzianum* inhibira rast gljive *Rizoctonia solani* penetracijom kroz njezin stanični zid što dovodi do dezintegracije hifa potonje (slika 4.). U ovom slučaju se radi o mikoparazitizmu.




Figure 2. Micrograph of light microscope showing coiling of *T. harzianum* over *R. solani*. Arrows point to interaction zones between *T. harzianum* and *R. solani*.

Slika 4. Parzitski odnos između *T. harzianum* i *R. solani*

Izvor: <http://www.scielo.org.mx/img/revistas/tsa/v13n1/a13f2.jpg>


4. Podjela biofungicida i njihova uporaba

Biofungicidi na bazi gljiva

Trichoderma sp. su gljive koje se mogu pronaći u većini obradivih tala. Posjeduju izražen mikoparazitizam te antibiotiku. Mikoparazitski proces je zasnovan na direktnom kontaktu micelija antagonista i patogena, a nakon toga sekreti enzima obavljaju degradaciju staničnog zida domaćina (Kubicek et al., 2001.).

Vrste roda *Trichoderma* imaju sposobnost lučenja snažnog hidrolitičkog multienzimskog kompleksa koji sadržavaju: hitinaze (de la Cruz et al., 1992.), α -1,3-glukonaze (Noronha and Ulhoa, 1996.), α -1,6-glukonaze (de la Cruz and Llobell, 1999.), α -1,3-glukonaze (Ait-Lahsen et al., 2001.), proteaze (Geremia et al., 1993.) i celulaze (Monte and Llobell, 2003.).

Trichoderma harzianum (slika 5.) je svojstveno da utječe na pojačan porast biljaka što se moglo uočiti na osnovu pokusa u plastenicima. Prema navodima (Chet i sur., 2006.) ustanovljeno je povećanje porasta klijanja za 30% i korijenovog sustava tih biljaka za 95%.



Slika 5. *Trichoderma harzianum*

Izvor: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Trichoderma_harzianum.jpg

Preparat Trichodex WP na bazi *Trichoderma harzianum* registriran je u Hrvatskoj. Prvo tretiranje preparatom se obavlja u vrijeme cvatnje vinove loze i to u koncentraciji od 0,3-0,4 %. Potrebno je 3-4 kg/ha u 1000 l vode (300-400 g/100 l vode). Po sezoni je potrebno obaviti do četiri tretiranja. Karenca za grožđe iznosi 14 dana. Navedeno se odnosi za suzbijanje *Botrytis cinerea*.

Kako navodi Lu i (2009.), *Trichoderma harzianum* je kontaktni antibiotski fungicid niske toksičnosti za čovjeka, korisne kukce i životnu sredinu, prikladan za ekološku zaštitu u vinogradima, voćnjacima, povrtnjacima, ratarstvu i uzgoju ukrasnog bilja.

U Hrvatskoj je registriran za suzbijanje gljive *Botrytis cinerea* na vinovoj lozi i jagodama (Maceljski, 2005; Lu i , 2009.).



Slika 6. Preparat Trichodex


Izvor: <http://www.agribio.it/trichodex>

Thomas (2004.) navodi da se preparat pod nazivom Plantshield na bazi *T. harzianum* (izolat T-22) u Virdžiniji upotrebljava za suzbijanje *Fusarium spp.*, *Sclerotinia spp.*, *Rhizoctonia solani* i *Pythium spp.* u rasadnicima drvenastih biljaka, na ukrasnim biljkama, pri kalemljenju, kupusnjačama, rajčici i krastavcima.

Trichoderma viride spada u grupu bioloških fungicida. Kako naseljava korijenov sustav gljiva inducira lokalnu i sistemsku otpornost biljke na napad patogena (*Fusarium spp.*, *Rhizoctonia spp.*, *Armilaria spp.*). Miceliji te gljive stvaraju različit spektar enzima uključujući i celulaze i hitinaze koji razgrađuju celulozu i hitin. U slučaju tretiranja sjemena gljivica kolonizira te vrši napad na patogena, ali i ujedno stvara zaštitu od spomenutih. Svojom razvojem na biljci ona omogućuje dotic i povećanje korijenove apsorpcije hraniva te na taj način uvjetuje bolji razvoj korijena što na kraju dovodi i do veće proizvodnje.

U vinogradarstvu se preparat na bazi *T. viride* (Vital Tricho) rabi folijarno i to kad je 70 % biljaka u fazi pupanja, a nakon toga se tretira svakih 7-10 dana. Potrebno je napraviti minimalno tri tretmana u koncentraciji 0,5 %, dakle po 1 ha potrebno je 1,2 kg/250 l vode.

Gliocladium ssp. spadaju u bitnije biopreparate koji obuhvaćaju široko područje djelovanja te pokazuju određenu efikasnost pri suzbijanju velikog broja patogena. *G.roseum* (teleomorf *N. ochroleuca* Schwein.) je najzastupljenija vrsta ovog roda, a njeno prisustvo je zabilježeno u svim klimatskim regijama svijeta, na različitim staništima i supstratima (sjemenu poljoprivrednih kultura, šumskom i ukrasnom bilju, lišću i plodovima voća) (Sutton et al., 1997.).



Slika 7. *Gliocladium roseum*

Izvor:

http://vignette4.wikia.nocookie.net/r6kbio/images/6/66/20081105_Gliocladium_roseum.jpg/revision/latest?cb=20101115044343

Gljiva obitava u tlu u svojstvu saprofita odakle apsorbira potrebni materijal. Pored navedenog *Gliocladium roseum* ima mogućnost uspostavljanja i parazitskog odnosa sa drugim gljivama te nematodama. Inhibicija klijanja spora, direktan mehanički pritisak na isključuje konidije i micelij patogeno-doma ina jedan je od oblika antimikrobne aktivnosti *Gliocladium spp.* prema *B. cinerea*, *B. allii* i *F. oxysporum* (Yu and Sutton, 1997.).

Gljiva proizvodi širok spektar toksičnih komponenti kao svojevrsan sustav zaštite od drugih gljiva, bakterija i kukaca. Antibioza se ostiže izlučivanjem enzima i antibiotika koji degradiraju staničnu stijenku napadnutog mikroorganizma. Svi ispitivani izolati zaustavljaju svoj rast uslijed prisustva inhibitornih tvari (enzima i antibiotika), koje izlučuje *G. roseum* (Grahovac, 2009).

Coniothyrium minitans rod CON/M/91-08 nastaje fermentacijom, tamno smeđe je boje, mirisa po gljivama. Čuva se na 4°C i stabilnost mu se procjenjuje na više od pola godine. Mehanizam djelovanja preparata se temelji na sporama gljive *C. minitans* koje napadaju sklerocije gljive *Sclerotinia sp.* te ih uništava. Spore *C. minitans* penetriraju preko pukotina na površini ili preko vanjske strane sklerocija gdje se rast nastavlja kroz tkiva korteksa i ide do srži sklerocija. Cijeli postupak je popraćen enzimatskom razgradnjom tkiva koja su zahvaćena. U središnjem dijelu dolazi do plazmolize i agregacije staničnih zidova. U razdoblju od 14 dana pri idealnim uvjetima dolazi do stvaranja piknida u unutarnjem te vanjskom dijelu sklerocija (Grahovac i sur., 2009.).



Slika 8. *S. sclerotiorum* kolonizirana od strane *C. minitans*

Izvor:

http://msue.anr.msu.edu/uploads/news/in_article/White_Mold_Biological_Control.jpg

C. minitans nalazi primjenu u suzbijanju *Sclerotinia sclerotiorum* i *Sclerotinia minor* na različitim kulturama (povrće, voće, duhan, soja, repa, itd.), pred ili poslije sjetve (Tomlin, 2006.).

Prema Lainsbury (2009.) tretiranje preparatom na bazi *C. minitans* se obavlja 3 mjeseca prije redovne zaštite od bolesti, kako bi se omogućilo vrijeme da se smanji brojnost infektivnih sklerocija u tlu.

Primjenom ovog preparata nakon žetve sprjeva se daljnja kontaminacija tla sklerocijima formiranim na prethodnom usjevu. Preparat se inkorporira u površinski sloj tla na dubini od 10 cm, uz uvjet da je tlo vlažno s temperaturom 12-20° C (Grahovac i sur., 2009.).

Od preparata na bazi *C. minitans* u upotrebi su: Contans WG, Nativo 75 WG, Rudis, itd.

Ampelomyces quisqualis (AQ 10) služi u svrhu suzbijanja pepelnice vinove loze (*Uncinula necator*). Upotreba ovog preparata je odobrena u Italiji, Francuskoj, Sloveniji i Švicarskoj. Rabi se preventivno u slučaju zamijeivanja minimalno tri kolonije parazita na lišću ili na bobicama. Gljiva djeluje u određenim uvjetima relativne vlage zraka (60%) i temperature (12°C).

A. quisqualis hiperparazitira na kleistotecijima (plodištima) *U. necator* te smanjuje broj prezimljenih kleistocija pepelnice.



Slika 9. *Ampelomyces quisqualis*

Izvor : <http://www.discoverlife.org/>




Slika 10. Preparat AQ 10

Izvor : <http://www.karsia.si/aq-10>

Biofungicidi na bazi bakterija

Bacillus thuringiensis spp. posjeduje specifično djelovanje na određene kukce dok pritom ne šteti korisnim organizmima. Mehanizam djelovanja bakterije se ispoljava u vidu njena unosa putem hrane u tijelo kukca (npr. krumpirova zlatica, gusjenice različitih leptira) koji se hrani listom tretirane biljke. U organizmu kukca bakterija stvara toksične kristale koji pogubno djeluju na njegov crijevni sustav. Kao posljedica dolazi do prestanka ishrane te nakon 3-5 dana kukac ugiba. Fotolabilnost preparata je uzrok njegovog kratkog djelovanja koje iznosi od 7 do 8 dana i stoga je potrebno ponoviti tretiranje.



Slika 11. *Bacillus thuringiensis*


Izvor: <https://biocontrol.entomology.cornell.edu/images/pathogens/B-thuring-image1.jpg>

U organskoj poljoprivredi su dopušteni rodovi poput: *Bacillus thuringiensis* var. *aizwai*, var. *israeliensis*, var. *kurstaki*, var. *tenebrions*. Me u poznatije preparate spadaju: Turex (Novartis), Solbac (Andermatt), Dipel (Siegfried), Baktur (CTA), Novodor (Andermatt Leu-Gygax).

Bacillus subtilis Cohn; var. *amyloliquefaciens* izolat GB03 (Gustafson) se upotrebljava za tretiranje leguminoza, sjemena pamuka, povrća, pšenice, ječma, soje, u kontroli *Fusarium spp.*, *Aspergillus spp.*, *Rhizoctonia solani*.

Bakterija (slika 7.) naseljava korijenov sustav napadnute biljke i na taj način dolazi do kompeticijskih odnosa sa patogenim mikroorganizmima.

Nakon primjene tj. tretiranja sjemena ili zalijevanja biljaka formira se zaštitna barijera u području rizosfere. Bakterija tijekom cijele vegetacije pruža zaštitu od patogena. Nema štetnog utjecaja na biljku.



Slika 12. *Bacillus subtilis* Cohn

Izvor: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Bacillus_subtilis.jpg

Pored izolata GB03 vrijedi istaknuti i izolat QST713. Njima se tretira sjeme leguminoza, pamuka te drugih vrsta u kontroli *Fusarium spp.*, *Rhizoctonia solani*, *Alternaria spp.*, *Aspergillus spp.*, *Botrytis cinerea*, *Sphaerotheca aphani*. Poznati preparati su: Serenade WP, Botokiller, Subtilex i System 3 (*B. subtilis* + metalaxyl + quintozene), (Tomlin, 2006.). Serenade WP se rabi u koncentraciji 2,5-4 kg na 500-1000 l vode.




Slika 13. Serenade WP

Izvor : <http://agronotizie.imagelinenetwork.com/>

Streptomyces griseoviridis izolat K61 je bakterija koja djeluje na patogene gljive uzrokuju i biljne bolesti i to koloniziranjem korijena biljaka prije pojave patogenih gljiva ime ih lišava prostora i hranjivih tvari (Grahovac i sur., 2009.).

Streptomyces griseoviridis primjenu nalazi u kontroli gljiva koje su uzročnici truleži sjemena, stabljike, korijena i venula u ratarskim i povrtlarskim usjevima, te u njacima. Može se primijeniti folijarno, potanjem rasada i biljnih dijelova prije kalemljenja, zatim preko sjemena i tla. Navedeni biofungicid treba primijeniti preventivno, tj. prije nego što patogene gljive dostignu prag štetnosti (Grahovac i sur., 2009.).



Slika 14. *Streptomyces griseoviridis*

Izvor: <http://www.lagrotecnico.it/immagini/Streptomyces%20griseoviridis.jpg>

Spomenuti izolat ne djeluje štetno ukoliko se unese u organizam, međutim u nekim slučajevima može doći do iritacije oči ili kože. Rukovatelji su obvezni nositi zaštitnu opremu pri tretiranju.

Prema Tomlinu (2006.), *S. griseoviridis* rabi se za kontrolu *Fusarium* i drugih patogena. Preparat Mycostop koji je namijenjen za biološku borbu u integriranoj zaštiti bilja je registriran u Mađarskoj (Ocsko i sur. 2008.).

Streptomyces lydicus, izolat WYEC 108. Pri određenim klimatskim uvjetima bakterija producira antibiotike i antifungalne sekundarne metabolite.

Bakterija proizvodi enzim hitinazu koji destruktivno djeluje na stanične zidove određenih patogenih gljiva (Sims, 1998.).

Od pripravaka na bazi bakterije *S. lydicus* valja izdvojiti preparat Actinovate SP, registriran u S.A.D. Rabi se u svrhu zaštite od sive plijeni i pepelnice u voćarstvu i povrćarstvu.




Slika 15. Biopreparat Actinovate SP

Izvor:

http://www.earlysgarden.com/components/com_mijoshop/opencart/image/cache/data/product/Garden/Greenhouse%20Supplies/Actinovate_Package-700x700.jpg

Biofungicidi na bazi virusa



Slika 16. *Baculovirus*

Izvor:

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Baculovirus.jpg/200px-Baculovirus.jpg>

Baculoviruses ili mikrobiološki virusi javljaju se u prirodi te posjeduju sposobnost zaraze i uništavanja određenih vrsta štetnih kukaca. Među zastupljenijima su virus granuloze te virus poliedarije (suzbijanje gusjenica različitih vrsta).

Patogeni virusi se mogu na dva načina prenijeti na domaćina: roditelji preko jajašaca prenose virus na sljedeću generaciju i direktna infekcija domaćina. Nakon par dana od unošenja hrane javljaju se simptomi i zaražena jedinka se prestaje hraniti te dolazi do diskoloracije kutikule. U roku 2 – 3 dana nakon pojave simptoma dolazi do uginuća domaćina.

Među važnije patogene viruse ubrajaju se cytoplasmic polyhedrosis virus (CPV), nuclear polyhedrosis virus (NPV) i granulosis virus (GV).

Glavni nedostaci preparata su ovisnost o klimatskim faktorima, fotolabilnost, kratkotrajno i sporo djelovanje te užu spektar djelovanja. Da bi se postigao odgovarajući efekt potrebno je višekratno tretiranje u kombinaciji sa drugim mjerama. Od virusa u upotrebi su: *Helicoverpa armigera*, *Anagrapha falcifera*, *Autographa californica*, *Heliothis virescens*, itd. Zastupljeni preparati: Kathon 893 MW, Biotrol (Biocide G30), Elcar, Spod-X, TM Biocontrol.

Biopesticidi na bazi kvasaca

Rhodotorula glutinis (izolat LS-11), *Cryptococcus laurentii* (izolat LS-28), *Candida famata* (izolat 21-D) i *Pichia guilliermondii* (izolat 29-A) navode se kao vrlo efikasni antagonisti fitopatogenih gljiva (*Aspergillus niger*, *Botrytis cinerea*, *Rhizopus stolonifer*, *P. expansum*, *P. italicum* i *P. digitatum*) na plodovima jabuka, krušaka, jagoda, kivija, grožđa, naranči, mandarina i grejpfruta (Lima i sur., 1999.).

Različitim ispitivanjima spomenutih izolata došlo se do nekih novih saznanja. Prema Lima i sur. (1999.) koji su od dvjesto kvasaca izoliranih sa površina različitih plodova njih pedeset testirali za kontrolu *Penicillium expansum* na jabuci, najviše do izražaja po pitanju antagonizma spram spomenute gljive su došli *Rhodotorula glutinis* (izolat LS-11), *Cryptococcus laurentii* (izolat LS-28).



Slika 17. *Rhodotorula glutinis*

Izvor: http://nadidem.net/k/Rhod/thumbnails/Rhodotorula%20glutinis_jpg.jpg

Između ova dva dobivena izolata postoje izvjesne razlike. Testiranjem izolata na patogenima utvrđeno je da LS-28 ispoljava veću i stabilniju aktivnost od izolata LS-11. LS-28 je testiranjem na oštećenim plodovima jabuke iskazao veću gustoću koloniziranja u odnosu na drugi izolat (Lima i sur., 1998.).

Budući da su dva pomenuta izolata ispoljila različite nivoe antagonističke aktivnosti u kontroli više patogena na uskladištenim proizvodima, ispitani su mehanizmi delovanja. Kompeticija za hranljive materije imala je najvažniju ulogu u aktivnosti oba kvasca,

narođito izolata LS-11. Direktna interakcija sa hifama patogena utvrđena je samo kod izolata LS-11, dok kod aktivnijeg izolata LS-28, ovakva pojava nije registrirana. U odnosu na LS-11, izolat LS-28 je *in vitro* producirao značajno više ekstracelularne 1,3-glukanaze, kada je uzgajan u prisustvu hifa patogena *P. expansum* i *B. cinerea* antibioza nije bila registrirana. (Marusich i sar., 1997).

5. Problemi u proizvodnji i primjeni biofungicida

Tijekom proizvodnog postupka prijeko je potrebno voditi računa o pojedinim segmentima proizvodnje. Prema navodima Warriora, (2000.), za pozitivan rezultat u proizvodnji potrebno je ispuniti određene preduvjete:

-) kontrola proizvodnog postupka od početka uzgoja mikroorganizama;
-) kvalitetan postupak fermentacije;
-) oslobođenje mikroorganizama nakon postupka fermentacije;
-) kvalitetna formulacija konanog proizvoda.

Formulacije biofungicida spadaju u glavne preduvjete za uspješnu proizvodnju. U njima se često stavljaju različiti sastojci u svrhu povećanja vitalnosti, klijavosti i drugih osobina. Bitna stavka kod proizvodnje biofungicida je održavanje stabilnosti same formulacije za vrijeme miješanja s različitim preparatima gdje je potrebno voditi računa o nekim faktorima poput temperature, razine kiselosti, itd.

Biopreparati se mogu primijeniti u obliku polunativne kulture ili u različitim formulacijama: vodotopive granule, pelete, mikrokapsule, prašiva, topiva prašiva, emulzije.

Nedostatak bioloških preparata je kratak rok čuvanja, ali taj problem se rješava inkapsulacijom mikroorganizama ili njihovih produkata u matrice organskih polimera. Biopreparati mogu sadržavati jedan ili više i broj mikroorganizama kao aktivnih tvari (Klokočar-Šmit i sur., 2006.).

S napretkom tehnologije došlo je i do razvijanja novih načina formuliranja biopreparata. Jedan od njih je mikroinkapsulacija. Rabe se kapsule sitnih dimenzija, veličine do 100 µm, u kojima se nalaze željeni mikroorganizmi i tvari namijenjene njihovom čuvanju.

Vosak je u funkciji nosača. Princip funkcioniranja je jednostavan, kapsula je stabilna sve dok se na određenoj temperaturi ne počne topiti i tada dolazi do oslobođenja mikroorganizama. U praksi je zastupljena još jedna metoda, mikroinkapsulacija do koje se dolazi miješanjem parafinskog voska i mikroorganizma. Tako dobivena tekućina se dezintegrira u sitne kapljice koje se potom hlade te na kraju formiraju mikrokapsule. Ovakav način primjene ima više prednosti, poput manjih troškova proizvodnje, jednostavnog skladištenja te jednostavne uporabe.

6. Prednosti i nedostaci biofungicida

U prednosti uporabe ubrajaju se:

-) bezopasni su za neciljane organizme;
-) upotreba bioloških tvari u programima integralne zaštite bilja osigurava razvoj održive poljoprivredne proizvodnje (Grahovac i sur., 2009.);
-) manja fitotoksi nost;
-) karenca i radna karenca posjeduju kratko vremensko trajanje;
-) primjena u eko i integriranoj proizvodnji;
-) smanjuju rizik od pojave rezistentnosti patogena u odnosu na kemijska sredstva (Filajdi i sur., 2003.);
-) sigurnija upotreba u odnosu na kemijska sredstva;
-) upotrebom se smanjuje potrošnja kemijskih preparata.

Postoje i određeni nedostaci kod njihove uporabe, poput:

-) usporavaju infekcije;
-) skuplji su od konkurencije rađene na kemijskoj bazi;
-) slabije i sporije djelovanje u odnosu na kemijske fungicide;
-) kompliciranost proizvodnje;
-) uži spektar djelovanja;
-) nemogućnost miješanja s drugim fungicidima i baktericidima;
-) potrebno je voditi računa o njihovom uskladištavanju.

7. Zaključak

Razvijanjem ljudske svijesti o zdravijem načinu života podjednako se razvijaju i metode kojima bi se to omogućilo. Kao alternativa kemijskoj zaštiti razvila se zaštita koja se temelji na uporabi korisnih mikroorganizama ili njihovog metaboličkog produkta. Kao produkti metabolizma nastaju spore, kristali, toksini, antibiotici koji djeluju i antagonisti koji na parazite štite biljke. Pored navedenog mikroorganizmi proizvode enzime, vitamine te biljne hormone čime utječu na imunitet biljke, povećavaju i joj otpornost. Zbog svojih antagonističkih i kompeticijskih odnosa spram štetnih mikroorganizama, korisni igraju glavnu ulogu u ekološkoj poljoprivredi. U patogene organizme se ubrajaju fitoplazme, fitopatogene bakterije, gljive i virusi. U slučaju vinove loze postoje mnogi patogeni mikroorganizmi koji dovode do bolesti te na kraju do samog smanjenja uroda. Među najvažnije bolesti kojima su uzročnici gljive, mogu se ubrojati: *Botrytis cinerea* (siva plijesan), *Uncinula necator* (pepelnica), *Plasmopara viticola* (plamenjača), *Phomopsis viticola* (crna pjegavost rozgve).

8. Popis literature:

1. Bali evi , R., Para ikovi , N., Šamota, D. (2007.): Control of soil parasites (*Pythium debaryanum*, *Rhizoctonia solani*) on tomato by a biological product. Cereal Research Communications. 35 (2 Part2): 1001-1004.
2. Chet, I., Viterbo, A. and Brotman, Y.: Plant biocontrol by *Trichoderma* spp. Department of Biological Chemistry, Jerusalem, Israel, 2006.
3. De La Cruz, J., Rey, M., Lora, J. M., Hidalgo-Gallego, A., Dominguet, F., Pintor-Toro, J. A., Llobell, A. & Benitez, T. (1993). Carbon source control on p-glucatiases, chitobiase and chitinase from *Trichoderma harzianum*. Arch Microbiol.
4. De La Cruz, J., Pintor-Toro, J. A., Beniter, T. & Llobell, A. (1995). Purification and characterization of an endo-p-1,G-glucanase from *Trichoderma harzianum* that is related to its mycoparasitism. J. Bacteriol., 177, 6937- 6945.
5. or evi , S (2008.): Primena mikroorganizama u organskoj proizvodnji. U: Organska poljoprivreda (Lazi , B., Babovi , J., urednici), Institut za ratarstvo i povrtlarstvo, Novi Sad.
6. Filajdi , N., Vukša, P., Ivanovi , M., Rekanovi , E. (2003.): Biološke mere zaštite bilja: problemi i perspektive. Pregledni rad. Pesticidi.
7. Grahovac, M., In i , D., Lazi , S., Vukovi , S. (2009.): Biofungicidi i mogu nosti primene u savremenoj poljoprivredi . Pestic. fitomed. (Beograd).
8. Grgi , A.: Biološki fungicidi i insekticidi u paleti Stockton-a. Zbornik sažetaka 53. seminara biljne zaštite – Glasilo biljne zaštite, 1/2: 54-55, 2009.
9. Igrc-Bar i , J., Maceljski, M. (2001.): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Zrinski d.d., akovec.
10. Kloko ar-Šmit, Z., Šovljanski, R., In i , D. (2006.): Biopreparati- alternativa u zaštiti plodovitog povr a. Biljni lekar, XXXIV.
11. Lu i , K. (2009.): Sadržaj sredstava za zaštitu bilja. Glasnik zaštite bilja.

12. Lainsbury, M. (2009.): The UK Pesticide Guide. BCPC, Norwich, UK.
13. Lima, G., Arru, S., De Curtis, V. and Arras, G. (1999.): Influence of antagonist, host fruit and pathogen on the biological control of postharvest fungal diseases by yeasts. *Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology*.
14. Lima, G., De Curtis, F., Castoria, R. and De Cicco, V. (1998.): Activity of the yeasts *Cryptococcus laurentii* and *Rhodotorula glutinis* against post-harvest rots on different fruits. *Biocontrol Science and Technology*.
15. Lu i , K.: Sadržaj sredstava za zaštitu bilja 2009. g. *Glasnik zaštite bilja*, 1-2: 191-192, 2009.
16. Maceljki, M., Cvjetkovi , B., Ostoji , Z., Igrc-Bar i , J., Pagliarini, N., Oštrec, Lj., Bari , K., izmi , I. (2004.): Šteto inje povr a. *Zrinski d.d., akovec*.
17. Maceljki, M.(2005.): Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj. *Glasilo biljne zaštite*.
18. Marusich, M.F., Robinson, B.H., Taanman, J.-W., Kim, S.J., Schillace, R., Smith, J.L., Capaldi, R.A., Castoria, R., De Curtis, F., Lima, G., De Cicco, V. (1997) -1, 3-glucanase activity of two saprophytic yeasts and possible mode of action as biocontrol agents against postharvest diseases. *Postharvest Biology and Technology*.
19. Monte, E., Llobell, A., 2003. *Trichoderma* in organic agriculture. Proc. V World Avocado Congress.
20. Noronha, E.F., Ulhoa, C.J., 1996. Purification and characterization of an endo- β -glucanase from *Trichoderma harzianum*.
21. Ocsko, Z., Molnar, J., Erdos, G. (2008.): *Novenyvedo szerek, termesvelo anyagok 2008/I. A Folmuvelesugyi es Videkfejlesztési Miniszterium, Budapest* .
22. Para ikovi , N., Vinkovi T., Iljki D. (2007.): Hydroponic Cultivation and Biological Protection of Pepper (*Capsicum annum* L.). *Acta Agriculturae Serbica*, 12(23): 19-24.
23. Tomlin, C. (Ed.) (2006.): *The Pesticide Manual* British Crop Protection Council. Farnham, UK.

24. Thomas, C. (2004.): Bug vs bug-managing plant diseases with biofungicides. Virginia Vegetable, Small Fruit and Speciality Crops.
25. Topolovec-Pintari , S., Cvjetkovi , B. (2003.): Biofungicidi - nova rješenja za suzbijanje biljnih bolesti. Glasilo biljne zaštite / Maceljki, Milan (ur.). - Zagreb : Hrvatsko društvo biljne zaštite, 23.
26. Warrior, P. (2000.): Living system as natural crop-protection agents. Pest Manag. Sci., 56, 681-687.
27. Yu H., Sutton J. C. (1997.): Morphological development and interactions of *Gliocladium roseum* and *Botrytis cinerea* in raspberry. Can. J. Plant Pathol. 19: 237-246.

9. Sažetak

U svrhu zadovoljavanja tržišnih zahtjeva po pitanju rasta i organske proizvodnje, od presudne je važnosti razvoj biološke kontrole. Najčešći i mehanizmi djelovanja korisnih mikroorganizama su: kompeticija, proizvodnja metabolita i mikoparazitizam. Mikrobiološki biofungicidi su u kompeticiji sa patogenim gljivama za hranu i prostor, stimuliraju sam proces odbrane biljaka te utječu na rast korijena.

Trichoderma harzianum se nalazi u biofungicidu Trihodex za suzbijanje sive truleži. *Gliocladium spp.* se iskazao kao efektan u suzbijanju *B. cinerea*, *B. allii* i *F. oxysporum*. *Coniothyrium minutans* se pokazao djelotvoran protiv *Sclerotinia sp.*

Prednosti uporabe biopreparata se ogledaju u smanjenju uporabe konvencionalnih pesticida bez smanjenja prinosa. Oni djeluju samo na ciljane organizme i neopasni su za okoliš. Postupak registracije im je jednostavniji i brži, traje manje od godinu dana. Neki od nedostataka su kratkotrajno i sporo djelovanje te uža spektra djelovanja, fotolabilnost i ovisnost o klimatskim faktorima. Od registriranih preparata u RH mogu se izdvojiti sljedeći: Trihodex, AQ 10, Serenade WP.

10. Summary

In order to meet market requirements in terms of the growing organic farming, is crucial the development of biological control. The most common mechanisms of action of beneficial microorganisms are: competition, production of metabolites and micoparasitism. Microbial biofungicides are in competition with pathogenic fungi for food and space, stimulate the process itself of defense plants and affect the growth of roots.

Trichoderma hrazianum is located in Trihodex to combat the gray rot. *Gliocladium spp.* had proved effective in combating *B. cinerea*, *B. allie* and *F. oxysporum*. *Coniothyrium minitans* has proven to be effective against *Sclerotinia sp.*

The advantages of using bioproducts are reflected in the reduction of the use of conventional pesticides without reducing yield. They act only on target organisms and non-hazardous for humans. The registration procedure of them is much simpler and shorter, lasting less than a year. Some of the disadvantages are short-lived and slow action and a narrower range of activities, photolability and dependence on climatic factors. Of registered products in the Republic of Croatia may be allocated as follows: Trichodex, AQ 10, Serenade WP.

11. Popis slika

Red br.	Naziv slike	Str.
Slika 1.	Zaraženi i inokulirani kultivar raj ice	4
Slika 2.	Zaraženi i i inokulirani korijen šljive	5
Slika 3.	<i>Gaeumannomyces graminis tritici</i>	5
Slika 4.	Parzitski odnos izmedju <i>T. harzianum</i> i <i>R. solani</i>	6
Slika 5.	<i>Trichoderma harzianum</i>	7
Slika 6.	Preparat Trichodex	8
Slika 7.	<i>Gliocladium roseum</i>	9
Slika 8.	<i>S. sclerotiorum</i> kolonizirana od strane <i>C. minitans</i>	10
Slika 9.	<i>Ampelomyces quisqualis</i>	11
Slika 10.	Preparat AQ 10	12
Slika 11.	<i>Bacillus thuringiensis</i>	12
Slika 12.	<i>Bacillus subtilis</i> Cohn	13
Slika 13.	Serenade WP	14
Slika 14.	<i>Streptomyces griseoviridis</i>	14
Slika 15.	Preparat Actinovate SP	15
Slika 16.	<i>Baculovirus</i>	16
Slika 17.	<i>Rhodotorula glutinis</i>	17

TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA

Diplomski rad

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet u Osijeku Sveučilišni diplomski studij Vinogradarstvo i vinarstvo

Benefitni mikroorganizmi kao alternativa kemijskim fungicidima

Milan Cvjetković

U svrhu zadovoljavanja tržišnih zahtjeva po pitanju rasta i organske proizvodnje, od presudne je važnosti razvoj biološke kontrole. Najvažniji mehanizmi djelovanja korisnih mikroorganizama su: kompeticija, proizvodnja metabolita te mikoparazitizam. Mikrobiološki biofungicidi su u kompeticiji sa patogenim gljivama za hranu i prostor, stimuliraju sam proces odbrane biljaka te utječu na rast korijena. *Trichoderma harzianum* se nalazi u biofungicidu Trihodex za suzbijanje sive truleži. *Gliocladium spp.* se iskazao kao efektan u suzbijanju *B. cinerea*, *B. allii* i *F. oxysporum*. *Coniothyrium minitans* se pokazao djelotvoran protiv *Sclerotinia sp.* Prednosti uporabe biopreparata se ogledaju u smanjenju uporabe konvencionalnih pesticida bez smanjenja prinosa. Oni djeluju samo na ciljane organizme i neopasni su za okoliš. Postupak registracije im je jednostavniji i kraći, traje manje od godinu dana. Neki od nedostataka su kratkotrajno i sporo djelovanje te užu spektralno djelovanje, fotolabilnost te ovisnost o klimatskim faktorima. Od registriranih preparata u RH mogu se izdvojiti sljedeći: Trihodex, AQ 10, Serenade WP.

Rad je izrađen pri: Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Mentor: Doc. dr. sc. Suzana Kristek

Broj stranica: 30

Broj slika: 17

Broj literaturnih navoda: 27

Jezik izvornika: hrvatski

Glavne riječi: korisni i patogeni mikroorganizmi, biološki pripravci, bolesti

Datum obrane:

Povjerenstvo za ocjenu i obranu diplomskog rada:

1. Izv.prof.dr.sc. Krolina Vrandeć, predsjednik
2. Prof.dr.sc. Suzana Kristek, mentor
3. Izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo, član
4. Doc.dr.sc. Sanda Rašić, zamjenski član

Rad je pohranjen u: Knjižnica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Sveučilište u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1d.

BASIC DOCUMENTATION CARD

Graduate thesis

University of Osijek

Faculty of Agriculture University graduate study Winery

Benefit microorganisms as an alternative to chemical fungicides

Milan Cvjetkovi

Summary: In order to meet market requirements in terms of the growing organic farming, is crucial the development of biological control. The most common mechanisms of action of beneficial microorganisms are: competition, production of metabolites and micoparasitism. Microbial biofungicides are in competition with pathogenic fungi for food and space, stimulate the process itself of defense plants and affect the growth of roots. *Trichoderma hrazianum* is located in Trihodex to combat the gray rot. *Gliocladium spp.* had proved effective in combating *B. cinerea*, *B. allie* and *F. oxysporum*. *Coniothyrium minitans* has proven to be effective against *Sclerotinia sp.* The advantages of using bioproducts are reflected in the reduction of the use of conventional pesticides without reducing yield. They act only on target organisms and non-hazardous for humans. The registration procedure of them is much simpler and shorter, lasting less than a year. Some of the disadvantages are short-lived and slow action and a narrower range of activities, photolability and dependence on climatic factors. Of registered products in the Republic of Croatia may be allocated as follows: Trichodex, AQ 10, Serenade WP.

The work was created at: Faculty of Agriculture

Mentor: PhD. Susan KRISTEK

Pages: 30

Number of photos: 17

Number of references: 27

Original in: Croatian

Keywords: beneficial and pathogenic microorganisms, biological preparations, diseases

Date of defense:

Commission for evaluation and defense of thesis:

1. PhD. Karolina Vrandecic, President
2. PhD. Susan Kristek, mentor
3. PhD. Drago Bešlo, member
4. PhD Sanda Rasic, a replacement member

The work is stored in the Library, Faculty of Agriculture, University of Osijek, King Peter Sva i a 1d.

